



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Arándano (*Vaccinium corymbosum* L.) de nombre BLUE BAYOU obtenida por The New Zealand Institute for plant and food research limited.

Solicitante: The New Zealand Institute for plant and food research limited

Representante legal: Martin Guerrico

Patrocinante: Exequiel E. Bustillo

Fundamentación de novedad: El cultivar inédito de nombre BLUE BAYOU se diferencia de las variedades Georgia Gem y Palmetto en las siguientes características:

Blue Bayou se diferencia de Georgia Gem en el ancho en completo desarrollo de la hoja, es de angosta a medio en Blue Bayou, mientras en Georgia Gem es angosta. El tamaño de la flor de Blue Bayou es de pequeño medio y en Georgia Gem es medio. La pigmentación antocianica del pétalo es más débil en Blue Bayou que en Georgia Gem. El tamaño del fruto es pequeño en Blue Bayou, mientras que en Georgia Gem es medio. La intensidad de la coloración verde del fruto inmaduro es claro a medio en Blue Bayou, en cambio en Georgia Gem es medio. La intensidad de la pruina del fruto es fuerte en Blue Bayou y en Georgia Gem es medio. La intensidad del color azul de la piel del fruto es oscuro en Blue Bayou, mientras que en Georgia Gem es medio. La dulzura del fruto es de medio a fuerte en Blue Bayou y en Georgia Gem es medio. La época de brotación es más temprana en Blue Bayou que en Georgia Gem. En cambio la época de inicio de floración es un poco más tardía en Blue Bayou.

La diferencia entre Blue Bayou y Palmetto son: las plantas de Blue Bayou son erectas, mientras que las de Palmetto son de porte matoso. El ancho de la hoja en completo desarrollo es más angosta en Blue Bayou. La pigmentación antocianica del pétalo es más débil en Blue Bayou que en Palmetto. Blue Bayou tiene un fruto pequeño, mientras que en Palmetto es de pequeño a medio. La intensidad de la coloración verde del fruto inmaduro es claro a medio en Blue Bayou, en cambio en Palmetto es claro. La intensidad de la pruina del fruto es fuerte en Blue Bayou y en Palmetto es medio. La época de brotación y el inicio de floración es de temprana a media en Blue Bayou, mientras que en Palmetto es temprana.

Fecha de verificación de estabilidad: 1997

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director de Registro de Variedades, Instituto Nacional de Semillas.

e. 14/10/2016 N° 76574/16 v. 14/10/2016

Fecha de publicacion: 14/10/2016